

AIDE À LA DISPENSATION DE NALOXONE

Destiné aux pharmacies d'officine



Intérêt d'une diffusion large de naloxone

Les opioïdes sont des médicaments essentiels dans la prise en charge des addictions et de certaines douleurs. Leur consommation peut s'accompagner **de risques de dépendance, mésusage, trouble de l'usage et surdose**, etc.

En France, la majorité des décès par surdose est due aux opioïdes ([DRAMES 2023](#)).

La naloxone est l'antidote spécifique des opioïdes. Des formes « prêtes à l'emploi » existent et sont utilisables par tous.

Le pharmacien d'officine acteur de la Réduction des Risques et des Dommages

Prévenir les surdoses aux opioïdes

Promouvoir et faciliter l'accès aux Traitements de Substitution aux Opioides (TSO)

Mettre à disposition du matériel d'injection stérile

NALOXONE
Les spécialités disponibles

	 Prenoxad®	 Nyxoid®	 Ventizolve®
CIP	34009 301 545 7 1	34009 301 813 9 3	34009 301 616 8 5
Indication thérapeutique	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 18 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 14 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 18 ans
Voie d'administration et forme pharmaceutique	Solution injectable en seringue pré-remplie pour voie Intra-musculaire	Solution pour pulvérisation nasale	Solution pour pulvérisation nasale
Contenu	1 seringue de 5 doses graduées (~ 0,36 mg/dose)	2 récipients unidoses de 1,8 mg	2 récipients unidoses de 1,26 mg
Conditions de prescription	Prescription médicale facultative	Prescription médicale obligatoire	Prescription médicale facultative
Lieux de dispensation	Pharmacie d'officine, CSAPA & CAARUD, hôpital	Pharmacie d'officine, CSAPA, hôpital	Pharmacie d'officine, CSAPA & CAARUD, hôpital
Prix et remboursement	22,16€ (hors honoraire de dispensation) Taux de remboursement : 65%	31,40€ (hors honoraire de dispensation) Taux de remboursement : 65%	Non remboursable Prix libre
Commande	Auprès des grossistes répartiteurs	Auprès des grossistes répartiteurs	Auprès des grossistes répartiteurs. Auprès du laboratoire : contact@cevidra.com

POUR QUI ?

Situations à risques de surdoses parmi les consommateurs d'opioïdes : TSO, médicaments opioïdes antalgiques et substances opioïdes illicites.



Initiation d'un traitement, perte de tolérance (après un arrêt ou une diminution des prises)



Patient présentant une **dépendance**



Patient en mésusage ou **troubles de l'usage** de médicaments opioïdes : augmentation des doses, recherche d'effets psychoactifs, nomadisme médical...



Patients exposés à des interactions pharmacologiques avec d'autres dépresseurs (opioïdes, benzodiazépines, alcool, prégabaline, etc.)



Usagers en « auto substitution » pour soulager une dépendance aux opioïdes



Antécédents de surdose aux opioïdes



Patients souffrant de comorbidités psychiatriques



Patients avec terrain à risque : insuffisants respiratoires, rénaux ou hépatiques, personnes âgées, obésité, patients fébriles, déshydratation, etc.



Intoxication accidentelle (enfant...)

Pour aller plus loin

- La Réduction des Risques et des Dommages dans le champ de l'addiction aux opioïdes disponible sur cespharm.fr
- Le [guide de l'addictologie](#) en pharmacie d'officine
- Délivrance des TSO à l'officine & Outils de réduction des risques : <https://www.officinetso.org>
- Le site naloxone.fr
- Les liens vers les laboratoires : **Prenoxad®** **Nyxoid®** **Ventizolve®**
- Les mesures additionnelles de réduction des risques sur le site de l'ANSM : **Nyxoid®** **Prenoxad®** **Ventizolve®**

Outils disponibles sur le site du CEIP-Addictovigilance PACA Corse

Foire aux questions



Vidéos naloxone



Découvrez toutes les ressources POP sur notre site



COMMENT REPÉRER LE MÉSUSAGE ET LE TROUBLE DE L'USAGE ?

- Consultation de l'historique de dispensation.
- Ordonnance suspecte.
- Utilisation de l'échelle de repérage du mésusage Prescription Opioid Misuse Index (POMI).
- Échange avec un autre professionnel, avec le patient, un proche du patient.

QUE FAIRE ?

- Informé sur le risque de surdoses (facteurs de risque, signes cliniques...).
- Dispenser un kit de naloxone et informer sur la conduite à tenir en cas de surdose.
- Orientation vers un médecin, un centre d'addictologie (CSAPA, CAARUD, etc.).

LES DEUX PRINCIPAUX SIGNES D'UNE SURDOSE OPIOÏDE



Dépression respiratoire, fréquence respiratoire <10/minute



Trouble de la conscience, coma, absence de réponse à un bruit fort ou au toucher